

表 1174 四肢切断の有無 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

Non-HDL-C濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	2,126 (94.6)	122 (5.4)	2,248 (100.0)	1	467	2,716
50～ (%)	10,164 (95.4)	490 (4.6)	10,654 (100.0)	13	2,239	12,906
70～ (%)	22,750 (96.0)	959 (4.0)	23,709 (100.0)	30	4,793	28,532
90～ (%)	27,007 (96.4)	1,009 (3.6)	28,016 (100.0)	35	5,528	33,579
110～ (%)	21,645 (96.7)	739 (3.3)	22,384 (100.0)	27	4,268	26,679
130～ (%)	13,080 (97.0)	406 (3.0)	13,486 (100.0)	14	2,633	16,133
150～ (%)	6,460 (96.8)	212 (3.2)	6,672 (100.0)	9	1,362	8,043
170～ (%)	2,872 (96.5)	105 (3.5)	2,977 (100.0)		590	3,567
190～ (%)	1,083 (96.4)	41 (3.6)	1,124 (100.0)	2	212	1,338
210～ (%)	638 (96.7)	22 (3.3)	660 (100.0)	4	168	832
合計 (%)	107,825 (96.3)	4,105 (3.7)	111,930 (100.0)	135	22,260	134,325
記載なし (%)	74,302 (96.1)	2,984 (3.9)	77,286 (100.0)	125	17,235	94,646
総計 (%)	182,127 (96.3)	7,089 (3.7)	189,216 (100.0)	260	39,495	228,971
平均	106.63	102.48	106.48	108.61	106.18	106.43
標準偏差	33.16	33.76	33.19	37.63	33.91	33.32

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査