

表 1175 四肢切断の有無 透析前収縮期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前収縮 期血圧	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	25 (92.6)	2 (7.4)	27 (100.0)		8	35
60～ (%)	216 (95.2)	11 (4.8)	227 (100.0)	1	43	271
80～ (%)	1,872 (94.6)	107 (5.4)	1,979 (100.0)	2	396	2,377
100～ (%)	10,601 (96.0)	436 (4.0)	11,037 (100.0)	9	2,109	13,155
120～ (%)	34,030 (97.1)	1,012 (2.9)	35,042 (100.0)	37	6,497	41,576
140～ (%)	52,499 (96.8)	1,747 (3.2)	54,246 (100.0)	60	9,897	64,203
160～ (%)	37,891 (96.1)	1,530 (3.9)	39,421 (100.0)	56	7,366	46,843
180～ (%)	14,408 (94.8)	788 (5.2)	15,196 (100.0)	26	2,780	18,002
200～ (%)	3,578 (93.3)	258 (6.7)	3,836 (100.0)	5	674	4,515
220～ (%)	702 (92.9)	54 (7.1)	756 (100.0)	1	137	894
合計 (%)	155,822 (96.3)	5,945 (3.7)	161,767 (100.0)	197	29,907	191,871
記載なし (%)	26,305 (95.8)	1,144 (4.2)	27,449 (100.0)	63	9,588	37,100
総計 (%)	182,127 (96.3)	7,089 (3.7)	189,216 (100.0)	260	39,495	228,971
平均	151.53	155.31	151.67	155.40	151.46	151.64
標準偏差	23.87	26.99	24.00	24.75	24.08	24.02

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査