

表 1176 四肢切断の有無 透析前拡張期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	52	3	55		12	67
(%)	(94.5)	(5.5)	(100.0)			
20～	471	35	506		106	612
(%)	(93.1)	(6.9)	(100.0)			
40～	13,078	628	13,706	10	2,641	16,357
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
60～	72,910	2,650	75,560	103	13,962	89,625
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
80～	38,099	1,410	39,509	41	7,290	46,840
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
90～	20,365	722	21,087	28	3,833	24,948
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
100～	9,818	440	10,258	14	1,870	12,142
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
120～	606	30	636	1	104	741
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
140～	49	1	50		7	57
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
合計	155,448	5,919	161,367	197	29,825	191,389
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
記載なし	26,679	1,170	27,849	63	9,670	37,582
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
総計	182,127	7,089	189,216	260	39,495	228,971
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
平均	77.59	77.11	77.57	78.55	77.48	77.56
標準偏差	14.34	15.47	14.38	13.60	14.42	14.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査