

表 1181 四肢切断の有無 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	12,288	152	12,440	4	2,632	15,076
(%)	(98.8)	(1.2)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	345	3	348		74	422
(%)	(99.1)	(0.9)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	229	2	231		53	284
(%)	(99.1)	(0.9)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	281	1	282		77	359
(%)	(99.6)	(0.4)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	160	1	161		34	195
(%)	(99.4)	(0.6)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	1,184	8	1,192	1	271	1,464
(%)	(99.3)	(0.7)	(100.0)			
腎硬化症	2,393	23	2,416		470	2,886
(%)	(99.0)	(1.0)	(100.0)			
悪性高血圧	248	2	250		62	312
(%)	(99.2)	(0.8)	(100.0)			
糖尿病性腎症	10,055	855	10,910	2	2,261	13,173
(%)	(92.2)	(7.8)	(100.0)			
SLE腎炎	315	4	319		44	363
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
アミロイド腎	48	1	49		10	59
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
痛風腎	127	3	130	1	23	154
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	32	1	33		11	44
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
腎・尿路結核	18		18		4	22
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎・尿路結石	57	1	58		11	69
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	73	1	74		11	85
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	63	1	64		10	74
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
骨髄腫	16		16		3	19
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎形成不全	86		86		15	101
(%)	(100.0)		(100.0)			
不明	2,710	58	2,768	1	711	3,480
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
再導入	340	9	349		67	416
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
その他	691	18	709		180	889
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
合計	31,759	1,144	32,903	9	7,034	39,946
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	31,759	1,144	32,903	9	7,034	39,946
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査