

表 1188 四肢切断の有無 透析時間(時間/回)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析時間	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
3.0未満	81	2	83		9	92
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			
3.0～	1,769	63	1,832	1	449	2,282
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
3.5～	2,002	66	2,068		411	2,479
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
4.0～	20,828	806	21,634	7	4,793	26,434
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
4.5～	3,238	86	3,324		524	3,848
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
5.0～	3,320	108	3,428		604	4,032
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
5.5～	195	4	199		19	218
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
6.0～	249	7	256		28	284
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
6.5～	15		15		2	17
(%)	(100.0)		(100.0)			
7.0～	31		31		5	36
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	31,728	1,142	32,870	8	6,844	39,722
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
記載なし	31	2	33	1	190	224
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
総計	31,759	1,144	32,903	9	7,034	39,946
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
平均	4.11	4.08	4.11	3.89	4.07	4.10
標準偏差	0.51	0.47	0.51	0.35	0.48	0.50

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査