

表 1189 四肢切断の有無 血流量(ml/分)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

血流量	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)					1	1
100～ (%)	30 (88.2)	4 (11.8)	34 (100.0)		3	37
120～ (%)	84 (97.7)	2 (2.3)	86 (100.0)		8	94
140～ (%)	1,080 (95.8)	47 (4.2)	1,127 (100.0)		215	1,342
160～ (%)	450 (96.2)	18 (3.8)	468 (100.0)		110	578
180～ (%)	2,250 (96.1)	92 (3.9)	2,342 (100.0)		604	2,946
200～ (%)	10,771 (96.0)	444 (4.0)	11,215 (100.0)	2	2,330	13,547
220～ (%)	5,312 (96.8)	174 (3.2)	5,486 (100.0)	3	1,118	6,607
240～ (%)	7,377 (97.0)	231 (3.0)	7,608 (100.0)	1	1,518	9,127
260～ (%)	885 (96.7)	30 (3.3)	915 (100.0)	1	162	1,078
280～ (%)	815 (96.9)	26 (3.1)	841 (100.0)		179	1,020
300～ (%)	2,098 (97.2)	60 (2.8)	2,158 (100.0)	1	306	2,465
350～ (%)	281 (96.9)	9 (3.1)	290 (100.0)		55	345
400～ (%)	163 (99.4)	1 (0.6)	164 (100.0)		38	202
合計 (%)	31,596 (96.5)	1,138 (3.5)	32,734 (100.0)	8	6,647	39,389
記載なし (%)	163 (96.4)	6 (3.6)	169 (100.0)	1	387	557
総計 (%)	31,759 (96.5)	1,144 (3.5)	32,903 (100.0)	9	7,034	39,946
平均	224.80	219.36	224.61	232.50	222.02	224.18
標準偏差	40.67	38.40	40.61	33.70	39.02	40.35

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査