

表 1192 四肢切断の有無 体重減少量(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)	84 (95.5)	4 (4.5)	88 (100.0)		9	97
0.0～ (%)	1,048 (94.8)	58 (5.2)	1,106 (100.0)	2	212	1,320
1.0～ (%)	5,988 (96.6)	213 (3.4)	6,201 (100.0)	2	1,197	7,400
2.0～ (%)	11,768 (96.6)	416 (3.4)	12,184 (100.0)	1	2,469	14,654
3.0～ (%)	6,430 (96.4)	242 (3.6)	6,672 (100.0)	1	1,341	8,014
4.0～ (%)	1,759 (95.8)	78 (4.2)	1,837 (100.0)	1	353	2,191
5.0～ (%)	306 (92.2)	26 (7.8)	332 (100.0)		68	400
6.0～ (%)	47 (94.0)	3 (6.0)	50 (100.0)		9	59
7.0～ (%)	14 (100.0)		14 (100.0)		2	16
8.0～ (%)	26 (96.3)	1 (3.7)	27 (100.0)		3	30
合計 (%)	27,470 (96.3)	1,041 (3.7)	28,511 (100.0)	7	5,663	34,181
記載なし (%)	246 (93.5)	17 (6.5)	263 (100.0)	1	526	790
総計 (%)	27,716 (96.3)	1,058 (3.7)	28,774 (100.0)	8	6,189	34,971
平均	2.57	2.60	2.57	2.11	2.57	2.57
標準偏差	1.03	1.10	1.03	1.29	1.03	1.03

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査