

表 1194 四肢切断の有無 Body Mass Index別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

Body Mass Index	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
14未満	122	6	128		21	149
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
14～	820	47	867		179	1,046
(%)	(94.6)	(5.4)	(100.0)			
16～	3,307	104	3,411	1	586	3,998
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
18～	6,286	216	6,502	2	1,110	7,614
(%)	(96.7)	(3.3)	(100.0)			
20～	6,990	187	7,177	1	1,284	8,462
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
22～	5,424	174	5,598	1	972	6,571
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
24～	3,373	111	3,484	3	601	4,088
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
26～	1,808	83	1,891		306	2,197
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
28～	965	45	1,010		167	1,177
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
30～	842	59	901		116	1,017
(%)	(93.5)	(6.5)	(100.0)			
合計	29,937	1,032	30,969	8	5,342	36,319
(%)	(96.7)	(3.3)	(100.0)			
記載なし	1,822	112	1,934	1	1,692	3,627
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
総計	31,759	1,144	32,903	9	7,034	39,946
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
平均	21.68	22.07	21.69	21.76	21.55	21.67
標準偏差	3.64	4.22	3.66	3.29	3.55	3.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査