

表 1195 四肢切断の有無 透析前BUN(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前BUN	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	28	2	30		9	39
(%)	(93.3)	(6.7)	(100.0)			
20～	244	22	266	1	42	309
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
30～	1,323	77	1,400		253	1,653
(%)	(94.5)	(5.5)	(100.0)			
40～	3,857	177	4,034		751	4,785
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
50～	6,675	271	6,946		1,372	8,318
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
60～	7,135	242	7,377	3	1,424	8,804
(%)	(96.7)	(3.3)	(100.0)			
70～	4,885	146	5,031	3	1,052	6,086
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
80～	2,287	77	2,364		467	2,831
(%)	(96.7)	(3.3)	(100.0)			
90～	843	27	870		181	1,051
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
100～	228	5	233		46	279
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
110～	55	2	57		17	74
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
120～	15	1	16		4	20
(%)	(93.8)	(6.3)	(100.0)			
合計	27,575	1,049	28,624	7	5,618	34,249
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
記載なし	141	9	150	1	571	722
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
総計	27,716	1,058	28,774	8	6,189	34,971
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
平均	62.26	59.32	62.15	62.14	62.67	62.23
標準偏差	15.04	15.82	15.08	15.91	15.09	15.08

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査