

表 1196 四肢切断の有無 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前クレアチニン 濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	3 (100.0)		3 (100.0)			3
2～ (%)	111 (89.5)	13 (10.5)	124 (100.0)		23	147
4～ (%)	689 (90.4)	73 (9.6)	762 (100.0)	1	155	918
6～ (%)	2,939 (93.5)	204 (6.5)	3,143 (100.0)	1	606	3,750
8～ (%)	7,042 (95.6)	327 (4.4)	7,369 (100.0)	1	1,377	8,747
10～ (%)	8,241 (96.8)	270 (3.2)	8,511 (100.0)	3	1,633	10,147
12～ (%)	5,398 (97.9)	116 (2.1)	5,514 (100.0)	1	1,123	6,638
14～ (%)	2,294 (98.5)	36 (1.5)	2,330 (100.0)		490	2,820
16～ (%)	840 (99.2)	7 (0.8)	847 (100.0)		201	1,048
合計 (%)	27,557 (96.3)	1,046 (3.7)	28,603 (100.0)	7	5,608	34,218
記載なし (%)	159 (93.0)	12 (7.0)	171 (100.0)	1	581	753
総計 (%)	27,716 (96.3)	1,058 (3.7)	28,774 (100.0)	8	6,189	34,971
平均	10.75	9.45	10.70	9.91	10.80	10.72
標準偏差	2.64	2.53	2.65	2.65	2.71	2.66

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査