

表 1198 四肢切断の有無 equilibrated Kt/V(eKt/V)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

equilibrated Kt/V (eKt/V)	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	13 (86.7)	2 (13.3)	15 (100.0)		5	20
0.4～ (%)	33 (89.2)	4 (10.8)	37 (100.0)		7	44
0.6～ (%)	264 (94.3)	16 (5.7)	280 (100.0)		56	336
0.8～ (%)	1,748 (94.9)	93 (5.1)	1,841 (100.0)		370	2,211
1.0～ (%)	5,962 (95.6)	274 (4.4)	6,236 (100.0)		1,266	7,502
1.2～ (%)	8,181 (96.3)	313 (3.7)	8,494 (100.0)	2	1,643	10,139
1.4～ (%)	5,831 (96.9)	184 (3.1)	6,015 (100.0)	3	1,112	7,130
1.6～ (%)	2,807 (97.6)	69 (2.4)	2,876 (100.0)	1	495	3,372
1.8～ (%)	1,068 (97.1)	32 (2.9)	1,100 (100.0)		192	1,292
2.0～ (%)	747 (98.4)	12 (1.6)	759 (100.0)		131	890
合計 (%)	26,654 (96.4)	999 (3.6)	27,653 (100.0)	6	5,277	32,936
記載なし (%)	1,062 (94.7)	59 (5.3)	1,121 (100.0)	2	912	2,035
総計 (%)	27,716 (96.3)	1,058 (3.7)	28,774 (100.0)	8	6,189	34,971
平均	1.35	1.28	1.35	1.50	1.34	1.35
標準偏差	0.29	0.28	0.29	0.18	0.28	0.29

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査