

表 1199 四肢切断の有無 nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満	30	6	36		7	43
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
0.4～	881	68	949		181	1,130
(%)	(92.8)	(7.2)	(100.0)			
0.6～	7,311	316	7,627		1,446	9,073
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
0.8～	12,064	441	12,505	4	2,371	14,880
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
1.0～	5,314	147	5,461	2	1,068	6,531
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
1.2～	959	20	979		188	1,167
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
1.4～	113		113		15	128
(%)	(100.0)		(100.0)			
1.6～	9	1	10		3	13
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
1.8～	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
2.0～	5		5		1	6
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	26,687	999	27,686	6	5,280	32,972
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
記載なし	1,029	59	1,088	2	909	1,999
(%)	(94.6)	(5.4)	(100.0)			
総計	27,716	1,058	28,774	8	6,189	34,971
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
平均	0.88	0.84	0.88	0.97	0.88	0.88
標準偏差	0.17	0.17	0.17	0.06	0.17	0.17

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査