

表 1200 四肢切断の有無 %クレアチニン産生速度(%)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

%クレアチニン 産生速度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	1,227 (89.4)	146 (10.6)	1,373 (100.0)		261	1,634
60～ (%)	1,082 (91.2)	104 (8.8)	1,186 (100.0)		218	1,404
70～ (%)	1,956 (92.7)	154 (7.3)	2,110 (100.0)		368	2,478
80～ (%)	3,144 (95.0)	167 (5.0)	3,311 (100.0)	1	556	3,868
90～ (%)	4,092 (95.9)	173 (4.1)	4,265 (100.0)	2	833	5,100
100～ (%)	4,778 (97.4)	127 (2.6)	4,905 (100.0)		929	5,834
110～ (%)	4,472 (98.4)	71 (1.6)	4,543 (100.0)	1	855	5,399
120～ (%)	3,162 (98.8)	37 (1.2)	3,199 (100.0)	1	643	3,843
130～ (%)	1,705 (99.2)	13 (0.8)	1,718 (100.0)	1	373	2,092
140～ (%)	1,058 (99.3)	7 (0.7)	1,065 (100.0)		243	1,308
合計 (%)	26,676 (96.4)	999 (3.6)	27,675 (100.0)	6	5,279	32,960
記載なし (%)	1,040 (94.6)	59 (5.4)	1,099 (100.0)	2	910	2,011
総計 (%)	27,716 (96.3)	1,058 (3.7)	28,774 (100.0)	8	6,189	34,971
平均	102.35	84.58	101.71	109.15	103.03	101.92
標準偏差	23.51	22.88	23.72	20.12	24.65	23.87

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査