

表 1201 四肢切断の有無 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前アルブミン 濃度	切斷なし	切斷あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	9 (90.0)	1 (10.0)	10 (100.0)			10
1.5～ (%)	49 (89.1)	6 (10.9)	55 (100.0)		7	62
2.0～ (%)	229 (90.2)	25 (9.8)	254 (100.0)		40	294
2.5～ (%)	1,081 (92.6)	87 (7.4)	1,168 (100.0)	2	222	1,392
3.0～ (%)	7,075 (95.7)	319 (4.3)	7,394 (100.0)	1	1,412	8,807
3.5～ (%)	16,792 (96.9)	533 (3.1)	17,325 (100.0)	2	3,258	20,585
4.0～ (%)	5,847 (97.5)	147 (2.5)	5,994 (100.0)	2	1,162	7,158
4.5～ (%)	269 (98.5)	4 (1.5)	273 (100.0)		44	317
5.0～ (%)	16 (100.0)		16 (100.0)		2	18
合計 (%)	31,367 (96.5)	1,122 (3.5)	32,489 (100.0)	7	6,147	38,643
記載なし (%)	392 (94.7)	22 (5.3)	414 (100.0)	2	887	1,303
総計 (%)	31,759 (96.5)	1,144 (3.5)	32,903 (100.0)	9	7,034	39,946
平均	3.64	3.50	3.64	3.41	3.64	3.64
標準偏差	0.39	0.45	0.39	0.59	0.38	0.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査