

表 1202 四肢切断の有無 透析前CRP濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前CRP濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	17,108 (97.7)	403 (2.3)	17,511 (100.0)	3	3,190	20,704
0.2～ (%)	5,266 (96.2)	208 (3.8)	5,474 (100.0)	1	1,002	6,477
0.5～ (%)	2,513 (95.0)	132 (5.0)	2,645 (100.0)		528	3,173
1.0～ (%)	1,532 (92.4)	126 (7.6)	1,658 (100.0)	1	344	2,003
2.0～ (%)	895 (92.9)	68 (7.1)	963 (100.0)		171	1,134
4.0～ (%)	314 (94.3)	19 (5.7)	333 (100.0)		74	407
6.0～ (%)	132 (91.7)	12 (8.3)	144 (100.0)	1	26	171
8.0～ (%)	61 (85.9)	10 (14.1)	71 (100.0)	1	22	94
10.0～ (%)	86 (89.6)	10 (10.4)	96 (100.0)		12	108
15.0～ (%)	62 (88.6)	8 (11.4)	70 (100.0)		14	84
合計 (%)	27,969 (96.6)	996 (3.4)	28,965 (100.0)	7	5,383	34,355
記載なし (%)	3,790 (96.2)	148 (3.8)	3,938 (100.0)	2	1,651	5,591
総計 (%)	31,759 (96.5)	1,144 (3.5)	32,903 (100.0)	9	7,034	39,946
平均	0.53	1.11	0.55	2.30	0.56	0.55
標準偏差	1.74	2.49	1.78	3.43	1.65	1.76

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査