

表 1203 四肢切断の有無 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前補正 カルシウム濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	133 (94.3)	8 (5.7)	141 (100.0)		19	160
7.0～ (%)	223 (97.4)	6 (2.6)	229 (100.0)		30	259
7.5～ (%)	760 (96.1)	31 (3.9)	791 (100.0)		160	951
8.0～ (%)	2,351 (97.0)	73 (3.0)	2,424 (100.0)		444	2,868
8.4～ (%)	684 (96.7)	23 (3.3)	707 (100.0)		111	818
8.5～ (%)	7,626 (96.9)	247 (3.1)	7,873 (100.0)	4	1,424	9,301
9.0～ (%)	9,380 (96.6)	332 (3.4)	9,712 (100.0)	1	1,802	11,515
9.5～ (%)	6,111 (96.4)	226 (3.6)	6,337 (100.0)		1,275	7,612
10.0～ (%)	712 (96.6)	25 (3.4)	737 (100.0)		166	903
10.1～ (%)	1,958 (95.8)	86 (4.2)	2,044 (100.0)	1	407	2,452
10.5～ (%)	922 (95.9)	39 (4.1)	961 (100.0)		209	1,170
11.0～ (%)	312 (96.3)	12 (3.7)	324 (100.0)	1	58	383
11.5～ (%)	109 (96.5)	4 (3.5)	113 (100.0)		19	132
12.0～ (%)	59 (95.2)	3 (4.8)	62 (100.0)		9	71
合計 (%)	31,340 (96.6)	1,115 (3.4)	32,455 (100.0)	7	6,133	38,595
記載なし (%)	419 (93.5)	29 (6.5)	448 (100.0)	2	901	1,351
総計 (%)	31,759 (96.5)	1,144 (3.5)	32,903 (100.0)	9	7,034	39,946
平均	9.18	9.23	9.18	9.43	9.21	9.19
標準偏差	0.75	0.80	0.75	1.03	0.73	0.75

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査