

表 1205 四肢切断の有無 PTH値(pg/mL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	1,386 (96.3)	53 (3.7)	1,439 (100.0)		244	1,683
20～ (%)	1,745 (95.5)	82 (4.5)	1,827 (100.0)		368	2,195
40～ (%)	1,977 (96.6)	70 (3.4)	2,047 (100.0)		390	2,437
60～ (%)	2,091 (96.6)	74 (3.4)	2,165 (100.0)	3	424	2,592
80～ (%)	2,333 (96.6)	82 (3.4)	2,415 (100.0)	1	430	2,846
100～ (%)	2,256 (96.7)	77 (3.3)	2,333 (100.0)		462	2,795
120～ (%)	2,078 (96.3)	80 (3.7)	2,158 (100.0)		423	2,581
140～ (%)	1,889 (96.4)	71 (3.6)	1,960 (100.0)	1	362	2,323
160～ (%)	1,749 (97.2)	50 (2.8)	1,799 (100.0)		351	2,150
180～ (%)	4,072 (97.1)	123 (2.9)	4,195 (100.0)		810	5,005
240～ (%)	66 (95.7)	3 (4.3)	69 (100.0)		8	77
241～ (%)	2,421 (97.1)	73 (2.9)	2,494 (100.0)		461	2,955
300～ (%)	1,388 (96.5)	50 (3.5)	1,438 (100.0)		276	1,714
360～ (%)	826 (96.4)	31 (3.6)	857 (100.0)		185	1,042
420～ (%)	451 (94.5)	26 (5.5)	477 (100.0)		114	591
480～ (%)	122 (98.4)	2 (1.6)	124 (100.0)		22	146
500～ (%)	176 (95.7)	8 (4.3)	184 (100.0)		53	237
540～ (%)	201 (96.6)	7 (3.4)	208 (100.0)	1	43	252
600～ (%)	351 (96.7)	12 (3.3)	363 (100.0)		60	423
800～ (%)	293 (96.7)	10 (3.3)	303 (100.0)		47	350
合計 (%)	27,871 (96.6)	984 (3.4)	28,855 (100.0)	6	5,533	34,394
記載なし (%)	502 (92.6)	40 (7.4)	542 (100.0)		192	734
総計 (%)	28,373 (96.5)	1,024 (3.5)	29,397 (100.0)	6	5,725	35,128
平均	177.41	174.17	177.30	166.50	177.03	177.26
標準偏差	171.59	166.91	171.43	197.89	158.74	169.45

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査