

表 1206 四肢切断の有無 PTH値(pg/mL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）PTH測定法:whole-PTH

PTH値	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	209	5	214		35	249
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
20～	251	15	266		35	301
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
35～	226	10	236		38	274
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
50～	358	10	368		76	444
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
75～	311	11	322		69	391
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
100～	272	5	277		54	331
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
125～	190	2	192		42	234
(%)	(99.0)	(1.0)	(100.0)			
150～	4		4			4
(%)	(100.0)		(100.0)			
151～	178	5	183		32	215
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
180～	116	1	117		20	137
(%)	(99.1)	(0.9)	(100.0)			
210～	83	2	85		13	98
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			
240～	77	1	78		10	88
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
300～	36	1	37		5	42
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
350～	26	1	27		2	29
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
400～	20		20		4	24
(%)	(100.0)		(100.0)			
500～	41	1	42		3	45
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			
合計	2,398	70	2,468		438	2,906
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
記載なし	8		8		23	31
(%)	(100.0)		(100.0)			
総計	2,406	70	2,476		461	2,937
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
平均	113.50	90.74	112.85		105.82	111.79
標準偏差	111.54	91.49	111.07		89.56	108.12

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査