

表 1208 四肢切断の有無 総コレステロール濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

総コレステロール濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	769 (92.4)	63 (7.6)	832 (100.0)	1	159	992
100～ (%)	2,316 (94.4)	138 (5.6)	2,454 (100.0)	2	532	2,988
120～ (%)	4,545 (95.8)	201 (4.2)	4,746 (100.0)		948	5,694
140～ (%)	5,623 (96.8)	188 (3.2)	5,811 (100.0)		1,094	6,905
160～ (%)	4,865 (97.0)	148 (3.0)	5,013 (100.0)	2	996	6,011
180～ (%)	3,145 (97.5)	81 (2.5)	3,226 (100.0)		647	3,873
200～ (%)	1,835 (98.1)	36 (1.9)	1,871 (100.0)	1	381	2,253
220～ (%)	774 (98.5)	12 (1.5)	786 (100.0)		170	956
240～ (%)	309 (97.8)	7 (2.2)	316 (100.0)		68	384
260～ (%)	161 (97.6)	4 (2.4)	165 (100.0)		51	216
合計 (%)	24,342 (96.5)	878 (3.5)	25,220 (100.0)	6	5,046	30,272
記載なし (%)	7,417 (96.5)	266 (3.5)	7,683 (100.0)	3	1,988	9,674
総計 (%)	31,759 (96.5)	1,144 (3.5)	32,903 (100.0)	9	7,034	39,946
平均	158.33	145.99	157.90	140.83	158.54	158.00
標準偏差	35.43	35.10	35.49	46.93	36.70	35.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査