

表 1209 四肢切断の有無 HDL-C濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

HDL-C濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	57	8	65		16	81
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
20～	1,449	117	1,566		308	1,874
(%)	(92.5)	(7.5)	(100.0)			
30～	4,935	229	5,164	3	964	6,131
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
40～	5,917	229	6,146	1	1,213	7,360
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
50～	4,843	124	4,967		1,004	5,971
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
60～	3,192	74	3,266	1	590	3,857
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
70～	1,645	25	1,670		353	2,023
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
80～	835	7	842		171	1,013
(%)	(99.2)	(0.8)	(100.0)			
90～	353	8	361	1	69	431
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
100～	307	5	312		71	383
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
合計	23,533	826	24,359	6	4,759	29,124
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
記載なし	8,226	318	8,544	3	2,275	10,822
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
総計	31,759	1,144	32,903	9	7,034	39,946
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
平均	51.03	44.09	50.80	54.33	51.14	50.85
標準偏差	17.14	15.42	17.13	23.79	17.42	17.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査