

表 1210 四肢切断の有無 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

Non-HDL-C濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	403 (94.4)	24 (5.6)	427 (100.0)	1	101	529
50～ (%)	1,884 (95.3)	93 (4.7)	1,977 (100.0)	1	425	2,403
70～ (%)	4,117 (96.2)	161 (3.8)	4,278 (100.0)	1	859	5,138
90～ (%)	5,055 (96.7)	170 (3.3)	5,225 (100.0)	1	1,039	6,265
110～ (%)	4,142 (97.0)	129 (3.0)	4,271 (100.0)	2	889	5,162
130～ (%)	2,519 (96.6)	90 (3.4)	2,609 (100.0)		540	3,149
150～ (%)	1,261 (96.8)	42 (3.2)	1,303 (100.0)		294	1,597
170～ (%)	563 (98.6)	8 (1.4)	571 (100.0)		111	682
190～ (%)	199 (95.7)	9 (4.3)	208 (100.0)		54	262
210～ (%)	106 (97.2)	3 (2.8)	109 (100.0)		32	141
合計 (%)	20,249 (96.5)	729 (3.5)	20,978 (100.0)	6	4,344	25,328
記載なし (%)	11,510 (96.5)	415 (3.5)	11,925 (100.0)	3	2,690	14,618
総計 (%)	31,759 (96.5)	1,144 (3.5)	32,903 (100.0)	9	7,034	39,946
平均	107.19	102.75	107.03	86.50	107.56	107.12
標準偏差	33.18	33.40	33.20	28.32	34.20	33.37

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査