

表 1211 四肢切断の有無 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前収縮 期血圧	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
60～ (%)	97 (97.0)	3 (3.0)	100 (100.0)		15	115
80～ (%)	511 (95.5)	24 (4.5)	535 (100.0)		80	615
100～ (%)	2,286 (96.3)	88 (3.7)	2,374 (100.0)	1	425	2,800
120～ (%)	6,187 (97.2)	181 (2.8)	6,368 (100.0)	3	1,268	7,639
140～ (%)	9,294 (97.1)	273 (2.9)	9,567 (100.0)	2	1,864	11,433
160～ (%)	6,631 (96.2)	263 (3.8)	6,894 (100.0)	2	1,412	8,308
180～ (%)	2,507 (95.3)	123 (4.7)	2,630 (100.0)		524	3,154
200～ (%)	650 (95.3)	32 (4.7)	682 (100.0)		140	822
220～ (%)	162 (87.6)	23 (12.4)	185 (100.0)		31	216
合計 (%)	28,327 (96.6)	1,010 (3.4)	29,337 (100.0)	8	5,759	35,104
記載なし (%)	3,432 (96.2)	134 (3.8)	3,566 (100.0)	1	1,275	4,842
総計 (%)	31,759 (96.5)	1,144 (3.5)	32,903 (100.0)	9	7,034	39,946
平均	150.38	154.66	150.52	142.00	151.40	150.67
標準偏差	24.98	28.79	25.13	17.36	24.57	25.04

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査