

表 1212 四肢切断の有無 透析前拡張期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	5		5		2	7
(%)	(100.0)		(100.0)			
20～	92	4	96		25	121
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
40～	2,170	119	2,289	1	390	2,680
(%)	(94.8)	(5.2)	(100.0)			
60～	12,042	429	12,471	5	2,496	14,972
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
80～	7,257	226	7,483	2	1,518	9,003
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
90～	4,321	135	4,456		861	5,317
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
100～	2,189	86	2,275		426	2,701
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
120～	135	6	141		28	169
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
140～	11		11		1	12
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	28,222	1,005	29,227	8	5,747	34,982
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
記載なし	3,537	139	3,676	1	1,287	4,964
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
総計	31,759	1,144	32,903	9	7,034	39,946
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
平均	79.19	77.90	79.15	71.88	79.30	79.17
標準偏差	14.70	16.28	14.76	10.51	14.40	14.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査