

表 1213 四肢切断の有無 透析前脈拍(拍/分)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前脈拍	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
40未満	14		14		3	17
(%)	(100.0)		(100.0)			
40～	251	7	258		37	295
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
50～	2,149	54	2,203	1	428	2,632
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
60～	6,884	203	7,087	3	1,400	8,490
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
70～	8,539	267	8,806	1	1,738	10,545
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
80～	5,608	256	5,864	2	1,197	7,063
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
90～	2,599	121	2,720		573	3,293
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
100～	817	52	869	1	172	1,042
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
110～	217	7	224		37	261
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
120～	92	5	97		9	106
(%)	(94.8)	(5.2)	(100.0)			
合計	27,170	972	28,142	8	5,594	33,744
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
記載なし	4,589	172	4,761	1	1,440	6,202
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
総計	31,759	1,144	32,903	9	7,034	39,946
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
平均	75.31	78.28	75.41	74.00	75.53	75.43
標準偏差	12.96	13.47	12.99	14.50	12.65	12.93

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査