

表 1224 四肢切断の有無 体重(kg)別（腹膜透析患者）

体重	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	38		38			38
(%)	(100.0)		(100.0)			
20～	22	1	23			23
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
30～	154	4	158		14	172
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
40～	805	13	818	2	84	904
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
50～	1,416	10	1,426	6	159	1,591
(%)	(99.3)	(0.7)	(100.0)			
60～	1,427	27	1,454	2	160	1,616
(%)	(98.1)	(1.9)	(100.0)			
70～	707	15	722	1	88	811
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
80～	262	4	266	4	28	298
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
90～	84	4	88		16	104
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
100～	17		17		3	20
(%)	(100.0)		(100.0)			
110～	7	1	8		2	10
(%)	(87.5)	(12.5)	(100.0)			
120～	9		9			9
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	4,948	79	5,027	15	554	5,596
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
記載なし	878	23	901	5	2,439	3,345
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
総計	5,826	102	5,928	20	2,993	8,941
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
平均	60.54	63.36	60.59	64.87	62.07	60.74
標準偏差	13.93	15.43	13.96	14.59	13.24	13.90

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査