

表 1226 四肢切断の有無 BUN(mg/dL)別（腹膜透析患者）

BUN	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	22		22		7	29
(%)	(100.0)		(100.0)			
20～	170	4	174		9	183
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
30～	583	15	598	3	71	672
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
40～	1,185	22	1,207	4	181	1,392
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
50～	1,373	21	1,394	6	213	1,613
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
60～	972	15	987	4	159	1,150
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
70～	482	3	485	1	63	549
(%)	(99.4)	(0.6)	(100.0)			
80～	211	3	214	1	30	245
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
90～	76	2	78		11	89
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
100～	30	1	31		9	40
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
110～	7		7			7
(%)	(100.0)		(100.0)			
120～	6		6		1	7
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	5,117	86	5,203	19	754	5,976
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
記載なし	709	16	725	1	2,239	2,965
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
総計	5,826	102	5,928	20	2,993	8,941
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
平均	54.82	52.26	54.78	53.89	55.79	54.90
標準偏差	15.92	16.04	15.92	13.14	15.18	15.82

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査