

表 1227 四肢切断の有無 クレアチニン濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

クレアチニン 濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	15 (100.0)		15 (100.0)		2	17
2～ (%)	130 (94.9)	7 (5.1)	137 (100.0)		17	154
4～ (%)	506 (97.7)	12 (2.3)	518 (100.0)	2	55	575
6～ (%)	994 (99.2)	8 (0.8)	1,002 (100.0)	5	126	1,133
8～ (%)	1,166 (97.9)	25 (2.1)	1,191 (100.0)	3	155	1,349
10～ (%)	928 (97.7)	22 (2.3)	950 (100.0)	3	162	1,115
12～ (%)	721 (98.6)	10 (1.4)	731 (100.0)	2	115	848
14～ (%)	407 (99.5)	2 (0.5)	409 (100.0)	3	76	488
16～ (%)	249 (99.6)	1 (0.4)	250 (100.0)	1	44	295
合計 (%)	5,116 (98.3)	87 (1.7)	5,203 (100.0)	19	752	5,974
記載なし (%)	710 (97.9)	15 (2.1)	725 (100.0)	1	2,241	2,967
総計 (%)	5,826 (98.3)	102 (1.7)	5,928 (100.0)	20	2,993	8,941
平均	9.84	9.02	9.82	10.03	10.32	9.89
標準偏差	3.53	3.25	3.53	3.54	3.49	3.53

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査