

表 1228 四肢切断の有無 アルブミン濃度(g/dL)別 (腹膜透析患者)

アルブミン 濃度	切斷なし	切斷あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	10 (90.9)	1 (9.1)	11 (100.0)		4	15
1.5～ (%)	59 (98.3)	1 (1.7)	60 (100.0)		11	71
2.0～ (%)	258 (95.9)	11 (4.1)	269 (100.0)		29	298
2.5～ (%)	877 (98.0)	18 (2.0)	895 (100.0)	2	140	1,037
3.0～ (%)	1,845 (98.5)	29 (1.5)	1,874 (100.0)	9	275	2,158
3.5～ (%)	1,640 (98.7)	22 (1.3)	1,662 (100.0)	7	237	1,906
4.0～ (%)	373 (98.7)	5 (1.3)	378 (100.0)	1	52	431
4.5～ (%)	19 (100.0)		19 (100.0)		2	21
5.0～ (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
合計 (%)	5,083 (98.3)	87 (1.7)	5,170 (100.0)	19	750	5,939
記載なし (%)	743 (98.0)	15 (2.0)	758 (100.0)	1	2,243	3,002
総計 (%)	5,826 (98.3)	102 (1.7)	5,928 (100.0)	20	2,993	8,941
平均	3.28	3.11	3.28	3.40	3.26	3.28
標準偏差	0.52	0.57	0.52	0.38	0.52	0.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査