

表 1229 四肢切断の有無 CRP濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

CRP濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	2,657 (98.8)	31 (1.2)	2,688 (100.0)	8	371	3,067
0.2～ (%)	844 (98.6)	12 (1.4)	856 (100.0)	4	135	995
0.5～ (%)	375 (96.4)	14 (3.6)	389 (100.0)	1	59	449
1.0～ (%)	260 (98.1)	5 (1.9)	265 (100.0)	2	41	308
2.0～ (%)	177 (97.3)	5 (2.7)	182 (100.0)	1	19	202
4.0～ (%)	72 (98.6)	1 (1.4)	73 (100.0)		10	83
6.0～ (%)	32 (97.0)	1 (3.0)	33 (100.0)		7	40
8.0～ (%)	18 (81.8)	4 (18.2)	22 (100.0)		2	24
10.0～ (%)	33 (100.0)		33 (100.0)		1	34
15.0～ (%)	7 (100.0)		7 (100.0)			7
合計 (%)	4,475 (98.4)	73 (1.6)	4,548 (100.0)	16	645	5,209
記載なし (%)	1,351 (97.9)	29 (2.1)	1,380 (100.0)	4	2,348	3,732
総計 (%)	5,826 (98.3)	102 (1.7)	5,928 (100.0)	20	2,993	8,941
平均	0.64	1.13	0.64	0.56	0.53	0.63
標準偏差	1.77	2.07	1.78	0.98	1.18	1.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査