

表 1230 四肢切断の有無 補正カルシウム濃度(mg/dL)別(腹膜透析患者)

補正 カルシウム濃度	切斷なし	切斷あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	23 (100.0)		23 (100.0)		6	29
7.0～ (%)	31 (100.0)		31 (100.0)		5	36
7.5～ (%)	102 (98.1)	2 (1.9)	104 (100.0)		23	127
8.0～ (%)	238 (97.9)	5 (2.1)	243 (100.0)		43	286
8.4～ (%)	73 (97.3)	2 (2.7)	75 (100.0)	1	10	86
8.5～ (%)	780 (98.9)	9 (1.1)	789 (100.0)	5	112	906
9.0～ (%)	1,390 (97.8)	31 (2.2)	1,421 (100.0)	5	176	1,602
9.5～ (%)	1,402 (98.4)	23 (1.6)	1,425 (100.0)	5	199	1,629
10.0～ (%)	168 (99.4)	1 (0.6)	169 (100.0)	1	21	191
10.1～ (%)	464 (98.7)	6 (1.3)	470 (100.0)	1	86	557
10.5～ (%)	249 (98.4)	4 (1.6)	253 (100.0)		43	296
11.0～ (%)	94 (97.9)	2 (2.1)	96 (100.0)	1	14	111
11.5～ (%)	25 (96.2)	1 (3.8)	26 (100.0)		3	29
12.0～ (%)	24 (100.0)		24 (100.0)		3	27
合計 (%)	5,063 (98.3)	86 (1.7)	5,149 (100.0)	19	744	5,912
記載なし (%)	763 (97.9)	16 (2.1)	779 (100.0)	1	2,249	3,029
総計 (%)	5,826 (98.3)	102 (1.7)	5,928 (100.0)	20	2,993	8,941
平均	9.41	9.43	9.41	9.37	9.41	9.41
標準偏差	0.79	0.72	0.79	0.67	0.86	0.80

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査