

表 1232 四肢切断の有無 PTH値(pg/mL)別（腹膜透析患者）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	94 (97.9)	2 (2.1)	96 (100.0)	1	27	123
20～ (%)	228 (97.4)	6 (2.6)	234 (100.0)		47	281
40～ (%)	221 (99.5)	1 (0.5)	222 (100.0)		45	268
60～ (%)	272 (97.8)	6 (2.2)	278 (100.0)		37	315
80～ (%)	257 (96.3)	10 (3.7)	267 (100.0)		42	309
100～ (%)	264 (98.5)	4 (1.5)	268 (100.0)		48	316
120～ (%)	258 (98.1)	5 (1.9)	263 (100.0)		42	305
140～ (%)	245 (97.2)	7 (2.8)	252 (100.0)		33	285
160～ (%)	243 (99.6)	1 (0.4)	244 (100.0)		32	276
180～ (%)	556 (98.8)	7 (1.2)	563 (100.0)		91	654
240～ (%)	9 (100.0)		9 (100.0)		1	10
241～ (%)	373 (98.7)	5 (1.3)	378 (100.0)		53	431
300～ (%)	290 (99.0)	3 (1.0)	293 (100.0)		38	331
360～ (%)	160 (98.2)	3 (1.8)	163 (100.0)		37	200
420～ (%)	118 (100.0)		118 (100.0)		21	139
480～ (%)	36 (100.0)		36 (100.0)		7	43
500～ (%)	44 (97.8)	1 (2.2)	45 (100.0)		9	54
540～ (%)	60 (98.4)	1 (1.6)	61 (100.0)		12	73
600～ (%)	94 (98.9)	1 (1.1)	95 (100.0)		10	105
800～ (%)	95 (99.0)	1 (1.0)	96 (100.0)		14	110
合計 (%)	3,917 (98.4)	64 (1.6)	3,981 (100.0)	1	646	4,628
記載なし (%)	312 (98.4)	5 (1.6)	317 (100.0)		59	376
総計 (%)	4,229 (98.4)	69 (1.6)	4,298 (100.0)	1	705	5,004
平均	225.21	181.36	224.50	58.00	220.27	223.88
標準偏差	223.15	177.41	222.54		267.52	229.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査