

表 1233 四肢切断の有無 PTH値(pg/mL)別（腹膜透析患者）PTH測定法:whole-PTH

PTH値	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	40		40			40
(%)	(100.0)		(100.0)			
20～	45		45			45
(%)	(100.0)		(100.0)			
35～	52	2	54		1	55
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
50～	76		76		1	77
(%)	(100.0)		(100.0)			
75～	67	2	69			69
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
100～	70	1	71			71
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
125～	45		45			45
(%)	(100.0)		(100.0)			
150～	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
151～	42		42		1	43
(%)	(100.0)		(100.0)			
180～	32		32		2	34
(%)	(100.0)		(100.0)			
210～	27		27			27
(%)	(100.0)		(100.0)			
240～	22	1	23			23
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
300～	19		19			19
(%)	(100.0)		(100.0)			
350～	8		8			8
(%)	(100.0)		(100.0)			
400～	11		11			11
(%)	(100.0)		(100.0)			
500～	11		11			11
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	568	6	574		5	579
(%)	(99.0)	(1.0)	(100.0)			
記載なし	108	2	110		30	140
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
総計	676	8	684		35	719
(%)	(98.8)	(1.2)	(100.0)			
平均	132.90	100.83	132.57		131.20	132.56
標準偏差	130.26	78.36	129.82		71.28	129.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査