

表 1234 四肢切断の有無 ヘモグロビン濃度(g/dL)別（腹膜透析患者）

ヘモグロビン 濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
5未満	6		6		1	7
(%)	(100.0)		(100.0)			
5～	13		13		1	14
(%)	(100.0)		(100.0)			
6～	25		25		3	28
(%)	(100.0)		(100.0)			
7～	102	1	103		21	124
(%)	(99.0)	(1.0)	(100.0)			
8～	278	8	286	3	55	344
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
9～	778	16	794	8	101	903
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
10～	1,461	20	1,481	1	224	1,706
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
11～	1,475	25	1,500	6	203	1,709
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
12～	677	11	688	1	107	796
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
13～	196	4	200		37	237
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
14～	69	3	72		7	79
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
合計	5,080	88	5,168	19	760	5,947
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
記載なし	746	14	760	1	2,233	2,994
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
総計	5,826	102	5,928	20	2,993	8,941
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
平均	10.81	10.84	10.82	10.08	10.80	10.81
標準偏差	1.42	1.49	1.42	1.27	1.42	1.42

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査