

表 1235 四肢切断の有無 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

総コレステロール濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	39 (95.1)	2 (4.9)	41 (100.0)		9	50
100～ (%)	128 (98.5)	2 (1.5)	130 (100.0)		30	160
120～ (%)	384 (97.2)	11 (2.8)	395 (100.0)	1	52	448
140～ (%)	677 (97.6)	17 (2.4)	694 (100.0)	4	108	806
160～ (%)	731 (98.5)	11 (1.5)	742 (100.0)	6	117	865
180～ (%)	724 (98.2)	13 (1.8)	737 (100.0)	2	94	833
200～ (%)	486 (99.4)	3 (0.6)	489 (100.0)	4	71	564
220～ (%)	286 (99.7)	1 (0.3)	287 (100.0)	1	30	318
240～ (%)	135 (99.3)	1 (0.7)	136 (100.0)		23	159
260～ (%)	125 (99.2)	1 (0.8)	126 (100.0)		23	149
合計 (%)	3,715 (98.4)	62 (1.6)	3,777 (100.0)	18	557	4,352
記載なし (%)	2,111 (98.1)	40 (1.9)	2,151 (100.0)	2	2,436	4,589
総計 (%)	5,826 (98.3)	102 (1.7)	5,928 (100.0)	20	2,993	8,941
平均	179.60	161.87	179.31	176.17	177.08	179.01
標準偏差	40.41	34.41	40.38	26.38	41.96	40.54

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査