

表 1237 四肢切断の有無 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

Non-HDL-C濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満	16		16		2	18
(%)	(100.0)		(100.0)			
50～	95	2	97		17	114
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
70～	288	5	293	1	57	351
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
90～	571	15	586	2	72	660
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
110～	673	13	686	1	110	797
(%)	(98.1)	(1.9)	(100.0)			
130～	565	5	570	1	91	662
(%)	(99.1)	(0.9)	(100.0)			
150～	373	6	379	3	54	436
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
170～	230	2	232	1	30	263
(%)	(99.1)	(0.9)	(100.0)			
190～	106	2	108		12	120
(%)	(98.1)	(1.9)	(100.0)			
210～	76		76		14	90
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	2,993	50	3,043	9	459	3,511
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
記載なし	2,833	52	2,885	11	2,534	5,430
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
総計	5,826	102	5,928	20	2,993	8,941
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
平均	128.80	118.78	128.64	131.11	127.30	128.47
標準偏差	37.97	32.29	37.90	33.04	38.92	38.01

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査