

表 1238 四肢切断の有無 収縮期血圧(mmHg)別 (腹膜透析患者)

収縮期血圧	切斷なし	切斷あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)					1	1
60～ (%)	12 (100.0)		12 (100.0)		1	13
80～ (%)	104 (97.2)	3 (2.8)	107 (100.0)		17	124
100～ (%)	568 (98.3)	10 (1.7)	578 (100.0)	1	62	641
120～ (%)	1,360 (98.3)	24 (1.7)	1,384 (100.0)	6	126	1,516
140～ (%)	1,410 (98.8)	17 (1.2)	1,427 (100.0)	4	148	1,579
160～ (%)	626 (98.6)	9 (1.4)	635 (100.0)	3	83	721
180～ (%)	188 (95.9)	8 (4.1)	196 (100.0)		21	217
200～ (%)	27 (100.0)		27 (100.0)		4	31
220～ (%)	8 (100.0)		8 (100.0)		2	10
合計 (%)	4,303 (98.4)	71 (1.6)	4,374 (100.0)	14	465	4,853
記載なし (%)	1,523 (98.0)	31 (2.0)	1,554 (100.0)	6	2,528	4,088
総計 (%)	5,826 (98.3)	102 (1.7)	5,928 (100.0)	20	2,993	8,941
平均	140.80	141.11	140.81	141.36	142.89	141.01
標準偏差	22.64	26.22	22.70	18.04	24.56	22.88

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査