

表 1239 四肢切断の有無 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

拡張期血圧	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
20～	14		14		1	15
(%)	(100.0)		(100.0)			
40～	322	7	329	1	45	375
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
60～	1,838	44	1,882	7	176	2,065
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
80～	1,147	9	1,156	3	137	1,296
(%)	(99.2)	(0.8)	(100.0)			
90～	639	8	647	2	65	714
(%)	(98.8)	(1.2)	(100.0)			
100～	304	3	307	1	39	347
(%)	(99.0)	(1.0)	(100.0)			
120～	16		16		2	18
(%)	(100.0)		(100.0)			
140～	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	4,282	71	4,353	14	465	4,832
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
記載なし	1,544	31	1,575	6	2,528	4,109
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
総計	5,826	102	5,928	20	2,993	8,941
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
平均	79.03	73.97	78.94	79.00	79.66	79.01
標準偏差	14.42	13.47	14.41	16.00	14.57	14.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査