

表 1243 大腿骨頸部骨折の既往 併用の状況別（透析患者全体）

併用の状況	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独	218,747	9,983	228,730	891	71,173	300,794
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
PD単独	4,496	119	4,615	46	2,527	7,188
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
HD(F)単独.PDカテ あり	187	2	189		80	269
(%)	(98.9)	(1.1)	(100.0)			
PD.HD併用週1 HD(F)	1,070	14	1,084	9	451	1,544
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
PD.HD併用週2 HD(F)	140	2	142	2	33	177
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
PD.HD併用週3 HD(F)	29	1	30		10	40
(%)	(96.7)	(3.3)	(100.0)			
PD.HD併用週4 HD(F)	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
PD.HD併用その他	57	2	59		14	73
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
合計	224,727	10,123	234,850	948	74,288	310,086
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
不明	7		7	8	7	22
(%)	(100.0)		(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	224,734	10,123	234,857	956	74,295	310,108
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査