

表 1245 大腿骨頸部骨折の既往 年齢(歳)別 (透析患者全体)

| 年齢 | 既往なし | 既往あり | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|--------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------|--------|---------|
| 15歳未満 (%) | 70 (100.0) | | 70 (100.0) | 1 | 46 | 117 |
| 15歳～ (%) | 785 (99.2) | 6 (0.8) | 791 (100.0) | 5 | 241 | 1,037 |
| 30歳～ (%) | 10,843 (98.9) | 120 (1.1) | 10,963 (100.0) | 39 | 3,383 | 14,385 |
| 45歳～ (%) | 42,211 (98.3) | 736 (1.7) | 42,947 (100.0) | 145 | 13,476 | 56,568 |
| 60歳～ (%) | 103,494 (96.5) | 3,734 (3.5) | 107,228 (100.0) | 402 | 34,348 | 141,978 |
| 75歳～ (%) | 64,007 (92.8) | 4,987 (7.2) | 68,994 (100.0) | 344 | 21,659 | 90,997 |
| 90歳～ (%) | 3,314 (86.0) | 539 (14.0) | 3,853 (100.0) | 20 | 1,132 | 5,005 |
| 合計 (%) | 224,724 (95.7) | 10,122 (4.3) | 234,846 (100.0) | 956 | 74,285 | 310,087 |
| 不明 (%) | 10 (90.9) | 1 (9.1) | 11 (100.0) | | 10 | 21 |
| 記載なし (%) | | | | | | |
| 総計 (%) | 224,734 (95.7) | 10,123 (4.3) | 234,857 (100.0) | 956 | 74,295 | 310,108 |
| 平均 | 67.21 | 74.55 | 67.53 | 69.06 | 67.55 | 67.54 |
| 標準偏差 | 12.49 | 10.81 | 12.51 | 12.87 | 12.43 | 12.49 |

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査