

表 1249 大腿骨頸部骨折の既往 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往別(腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

被囊性腹膜硬化症 (EPS)の既往	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
なし (%)	11,839 (97.9)	253 (2.1)	12,092 (100.0)	36	61	12,189
あり(剥離手術既往あり、 ステロイド使用歴あり) (%)	431 (92.7)	34 (7.3)	465 (100.0)		60	525
あり(剥離手術既往あり、 ステロイド使用歴なし) (%)	15 (100.0)		15 (100.0)		1	16
あり(剥離手術既往なし、 ステロイド使用歴あり) (%)	63 (96.9)	2 (3.1)	65 (100.0)		3	68
あり(剥離手術既往なし、 ステロイド使用歴なし) (%)	65 (100.0)		65 (100.0)		2	67
合計 (%)	12,413 (97.7)	289 (2.3)	12,702 (100.0)	36	127	12,865
不明 (%)	259 (97.0)	8 (3.0)	267 (100.0)	29	8	304
記載なし (%)	120 (69.8)	52 (30.2)	172 (100.0)		3,789	3,961
総計 (%)	12,792 (97.3)	349 (2.7)	13,141 (100.0)	65	3,924	17,130

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査