

表 1253 大腿骨頸部骨折の既往 腎移植の回数別（透析患者全体）

| 腎移植の回数 | 既往なし | 既往あり | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|-------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----|--------|---------|
| なし (%) | 201,957 (96.0) | 8,377 (4.0) | 210,334 (100.0) | 810 | 15,025 | 226,169 |
| 1回 (%) | 2,280 (95.9) | 97 (4.1) | 2,377 (100.0) | 4 | 269 | 2,650 |
| 2回 (%) | 114 (95.8) | 5 (4.2) | 119 (100.0) | | 20 | 139 |
| 3回 (%) | 7 (100.0) | | 7 (100.0) | | 2 | 9 |
| 4回以上 (%) | | | | | | |
| 合計 (%) | 204,358 (96.0) | 8,479 (4.0) | 212,837 (100.0) | 814 | 15,316 | 228,967 |
| 不明 (%) | 698 (96.7) | 24 (3.3) | 722 (100.0) | 105 | 92 | 919 |
| 記載なし (%) | 19,678 (92.4) | 1,620 (7.6) | 21,298 (100.0) | 37 | 58,887 | 80,222 |
| 総計 (%) | 224,734 (95.7) | 10,123 (4.3) | 234,857 (100.0) | 956 | 74,295 | 310,108 |

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査