

表 1254 大腿骨頸部骨折の既往 週透析回数(回/週)別 (透析患者全体)

週透析回数	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1回 (%)	1,471 (98.2)	27 (1.8)	1,498 (100.0)	13	329	1,840
2回 (%)	4,850 (95.9)	207 (4.1)	5,057 (100.0)	40	1,095	6,192
3回 (%)	211,477 (95.7)	9,509 (4.3)	220,986 (100.0)	850	48,803	270,639
4回 (%)	859 (96.4)	32 (3.6)	891 (100.0)	3	100	994
5回 (%)	78 (100.0)		78 (100.0)		11	89
6回 (%)	57 (100.0)		57 (100.0)		24	81
7回 (%)	30 (100.0)		30 (100.0)			30
合計 (%)	218,822 (95.7)	9,775 (4.3)	228,597 (100.0)	906	50,362	279,865
記載なし (%)	5,912 (94.4)	348 (5.6)	6,260 (100.0)	50	23,933	30,243
総計 (%)	224,734 (95.7)	10,123 (4.3)	234,857 (100.0)	956	74,295	310,108
平均	2.97	2.98	2.97	2.93	2.97	2.97
標準偏差	0.24	0.19	0.24	0.32	0.23	0.24

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査