

表 1256 大腿骨頸部骨折の既往 身長(cm)別（透析患者全体 男性のみ）

身長	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
130未満	107	4	111	1	15	127
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
130～	47	1	48		11	59
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
135～	94	6	100		10	110
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
140～	372	30	402	3	76	481
(%)	(92.5)	(7.5)	(100.0)			
145～	1,540	81	1,621	7	333	1,961
(%)	(95.0)	(5.0)	(100.0)			
150～	7,029	267	7,296	34	1,519	8,849
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
155～	18,956	667	19,623	79	4,032	23,734
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
160～	35,815	1,111	36,926	134	7,824	44,884
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
165～	36,861	957	37,818	146	7,915	45,879
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
170～	24,523	598	25,121	96	5,450	30,667
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			
175～	9,046	201	9,247	26	1,947	11,220
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
180～	2,410	43	2,453	11	500	2,964
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
185～	369	11	380	3	79	462
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
190～	59	3	62		14	76
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
合計	137,228	3,980	141,208	540	29,725	171,473
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
記載なし	8,545	292	8,837	64	17,767	26,668
(%)	(96.7)	(3.3)	(100.0)			
総計	145,773	4,272	150,045	604	47,492	198,141
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
平均	164.90	163.48	164.86	164.52	164.93	164.87
標準偏差	7.31	7.52	7.32	8.31	7.24	7.31

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査