

表 1259 大腿骨頸部骨折の既往 Body Mass Index別（透析患者全体 男性のみ）

Body Mass Index	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
14未満	399	28	427		78	505
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			
14～	2,801	224	3,025	12	570	3,607
(%)	(92.6)	(7.4)	(100.0)			
16～	12,121	613	12,734	43	2,471	15,248
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
18～	26,232	1,006	27,238	92	5,054	32,384
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
20～	33,109	868	33,977	140	6,542	40,659
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
22～	27,139	614	27,753	102	5,289	33,144
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
24～	16,440	289	16,729	75	3,193	19,997
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
26～	8,652	112	8,764	41	1,610	10,415
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
28～	4,341	59	4,400	13	797	5,210
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
30～	3,516	54	3,570	11	637	4,218
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
合計	134,750	3,867	138,617	529	26,241	165,387
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
記載なし	11,023	405	11,428	75	21,251	32,754
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
総計	145,773	4,272	150,045	604	47,492	198,141
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
平均	21.92	20.50	21.88	22.05	21.85	21.88
標準偏差	3.51	3.32	3.51	3.36	3.48	3.50

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査