

表 1260 大腿骨頸部骨折の既往 Body Mass Index別（透析患者全体 女性のみ）

Body Mass Index	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
14未満	756	143	899	1	181	1,081
(%)	(84.1)	(15.9)	(100.0)			
14～	4,134	583	4,717	21	845	5,583
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
16～	11,516	1,152	12,668	46	2,261	14,975
(%)	(90.9)	(9.1)	(100.0)			
18～	16,767	1,282	18,049	70	3,354	21,473
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
20～	15,202	962	16,164	61	3,036	19,261
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
22～	10,472	599	11,071	40	2,166	13,277
(%)	(94.6)	(5.4)	(100.0)			
24～	6,426	287	6,713	28	1,228	7,969
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
26～	3,623	148	3,771	16	727	4,514
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
28～	2,014	71	2,085	5	416	2,506
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
30～	1,977	60	2,037	11	345	2,393
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
合計	72,887	5,287	78,174	299	14,559	93,032
(%)	(93.2)	(6.8)	(100.0)			
記載なし	6,074	564	6,638	53	12,244	18,935
(%)	(91.5)	(8.5)	(100.0)			
総計	78,961	5,851	84,812	352	26,803	111,967
(%)	(93.1)	(6.9)	(100.0)			
平均	20.94	19.60	20.85	20.95	20.89	20.85
標準偏差	3.84	3.53	3.84	3.93	3.81	3.83

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査