

表 1261 大腿骨頸部骨折の既往 糖尿病の有無別（透析患者全体）

糖尿病の有無	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
糖尿病なし (%)	121,653 (96.5)	4,360 (3.5)	126,013 (100.0)	283	3,562	129,858
糖尿病あり (%)	102,333 (95.3)	5,071 (4.7)	107,404 (100.0)	405	31,444	139,253
合計 (%)	223,986 (96.0)	9,431 (4.0)	233,417 (100.0)	688	35,006	269,111
不明 (%)	748 (51.9)	692 (48.1)	1,440 (100.0)	268	39,289	40,997
記載なし (%)						
総計 (%)	224,734 (95.7)	10,123 (4.3)	234,857 (100.0)	956	74,295	310,108

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がない患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査