

表 1262 大腿骨頸部骨折の既往 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (透析患者全体)

透析前アルブミン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	150 (93.8)	10 (6.3)	160 (100.0)	1	24	185
1.5～ (%)	738 (91.1)	72 (8.9)	810 (100.0)	9	170	989
2.0～ (%)	3,071 (90.7)	316 (9.3)	3,387 (100.0)	28	646	4,061
2.5～ (%)	11,661 (91.0)	1,149 (9.0)	12,810 (100.0)	91	2,535	15,436
3.0～ (%)	51,245 (93.9)	3,336 (6.1)	54,581 (100.0)	232	11,295	66,108
3.5～ (%)	107,618 (96.6)	3,834 (3.4)	111,452 (100.0)	397	23,386	135,235
4.0～ (%)	40,387 (97.9)	884 (2.1)	41,271 (100.0)	149	9,088	50,508
4.5～ (%)	2,379 (98.4)	39 (1.6)	2,418 (100.0)	8	488	2,914
5.0～ (%)	176 (97.2)	5 (2.8)	181 (100.0)		22	203
合計 (%)	217,425 (95.8)	9,645 (4.2)	227,070 (100.0)	915	47,654	275,639
記載なし (%)	7,309 (93.9)	478 (6.1)	7,787 (100.0)	41	26,641	34,469
総計 (%)	224,734 (95.7)	10,123 (4.3)	234,857 (100.0)	956	74,295	310,108
平均	3.60	3.39	3.59	3.50	3.61	3.60
標準偏差	0.44	0.48	0.44	0.51	0.44	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査