

表 1263 大腿骨頸部骨折の既往 透析前CRP濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

透析前CRP濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	108,096 (96.5)	3,920 (3.5)	112,016 (100.0)	356	22,937	135,309
0.2～ (%)	35,585 (95.3)	1,766 (4.7)	37,351 (100.0)	131	7,325	44,807
0.5～ (%)	17,775 (94.6)	1,013 (5.4)	18,788 (100.0)	66	3,903	22,757
1.0～ (%)	11,507 (94.0)	732 (6.0)	12,239 (100.0)	62	2,447	14,748
2.0～ (%)	7,002 (93.4)	494 (6.6)	7,496 (100.0)	35	1,474	9,005
4.0～ (%)	2,471 (92.7)	195 (7.3)	2,666 (100.0)	16	562	3,244
6.0～ (%)	1,195 (92.2)	101 (7.8)	1,296 (100.0)	15	265	1,576
8.0～ (%)	654 (92.5)	53 (7.5)	707 (100.0)	2	161	870
10.0～ (%)	818 (92.2)	69 (7.8)	887 (100.0)	5	142	1,034
15.0～ (%)	531 (91.9)	47 (8.1)	578 (100.0)	6	109	693
合計 (%)	185,634 (95.7)	8,390 (4.3)	194,024 (100.0)	694	39,325	234,043
記載なし (%)	39,100 (95.8)	1,733 (4.2)	40,833 (100.0)	262	34,970	76,065
総計 (%)	224,734 (95.7)	10,123 (4.3)	234,857 (100.0)	956	74,295	310,108
平均	0.62	0.95	0.64	1.00	0.61	0.63
標準偏差	1.93	2.39	1.96	2.61	1.72	1.92

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査