

表 1264 大腿骨頸部骨折の既往 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

透析前補正 カルシウム濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	926 (96.8)	31 (3.2)	957 (100.0)	3	182	1,142
7.0～ (%)	1,296 (95.7)	58 (4.3)	1,354 (100.0)	8	287	1,649
7.5～ (%)	4,959 (95.9)	211 (4.1)	5,170 (100.0)	24	1,205	6,399
8.0～ (%)	16,102 (96.2)	639 (3.8)	16,741 (100.0)	57	3,641	20,439
8.4～ (%)	4,700 (96.1)	190 (3.9)	4,890 (100.0)	23	959	5,872
8.5～ (%)	53,227 (96.1)	2,155 (3.9)	55,382 (100.0)	220	11,717	67,319
9.0～ (%)	64,986 (95.8)	2,820 (4.2)	67,806 (100.0)	291	13,907	82,004
9.5～ (%)	42,612 (95.6)	1,967 (4.4)	44,579 (100.0)	155	9,235	53,969
10.0～ (%)	5,240 (95.7)	235 (4.3)	5,475 (100.0)	23	1,100	6,598
10.1～ (%)	13,251 (95.1)	686 (4.9)	13,937 (100.0)	59	2,981	16,977
10.5～ (%)	6,393 (94.5)	375 (5.5)	6,768 (100.0)	26	1,476	8,270
11.0～ (%)	2,128 (92.8)	166 (7.2)	2,294 (100.0)	12	475	2,781
11.5～ (%)	748 (93.6)	51 (6.4)	799 (100.0)	3	171	973
12.0～ (%)	531 (95.3)	26 (4.7)	557 (100.0)	5	119	681
合計 (%)	217,099 (95.8)	9,610 (4.2)	226,709 (100.0)	909	47,455	275,073
記載なし (%)	7,635 (93.7)	513 (6.3)	8,148 (100.0)	47	26,840	35,035
総計 (%)	224,734 (95.7)	10,123 (4.3)	234,857 (100.0)	956	74,295	310,108
平均	9.19	9.26	9.19	9.20	9.18	9.19
標準偏差	0.74	0.77	0.74	0.78	0.75	0.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査