

表 1265 大腿骨頸部骨折の既往 透析前リン濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

透析前リン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	8,160 (91.5)	755 (8.5)	8,915 (100.0)	38	1,933	10,886
3.0～ (%)	10,436 (93.7)	702 (6.3)	11,138 (100.0)	45	2,399	13,582
3.5～ (%)	18,504 (94.6)	1,057 (5.4)	19,561 (100.0)	81	4,040	23,682
4.0～ (%)	27,729 (95.2)	1,405 (4.8)	29,134 (100.0)	117	6,031	35,282
4.5～ (%)	33,234 (95.7)	1,487 (4.3)	34,721 (100.0)	133	7,205	42,059
5.0～ (%)	33,728 (96.0)	1,391 (4.0)	35,119 (100.0)	133	7,466	42,718
5.5～ (%)	29,185 (96.5)	1,049 (3.5)	30,234 (100.0)	101	6,370	36,705
6.0～ (%)	4,961 (96.4)	184 (3.6)	5,145 (100.0)	17	1,099	6,261
6.1～ (%)	16,692 (96.6)	580 (3.4)	17,272 (100.0)	76	3,761	21,109
6.5～ (%)	14,536 (96.9)	471 (3.1)	15,007 (100.0)	65	3,206	18,278
7.0～ (%)	8,968 (97.0)	275 (3.0)	9,243 (100.0)	32	2,002	11,277
7.5～ (%)	5,452 (97.1)	164 (2.9)	5,616 (100.0)	26	1,216	6,858
8.0～ (%)	3,245 (97.5)	82 (2.5)	3,327 (100.0)	13	713	4,053
8.5～ (%)	2,051 (97.4)	55 (2.6)	2,106 (100.0)	7	459	2,572
9.0～ (%)	3,201 (97.4)	87 (2.6)	3,288 (100.0)	23	766	4,077
合計 (%)	220,082 (95.8)	9,744 (4.2)	229,826 (100.0)	907	48,666	279,399
記載なし (%)	4,652 (92.5)	379 (7.5)	5,031 (100.0)	49	25,629	30,709
総計 (%)	224,734 (95.7)	10,123 (4.3)	234,857 (100.0)	956	74,295	310,108
平均	5.23	4.84	5.21	5.24	5.23	5.21
標準偏差	1.42	1.42	1.42	1.55	1.44	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査